




Legenda

-  Zwarte els
-  idem opslag
-  Wilg (smalbladig)
-  idem opslag/rij
-  Es
-  Klimop
-  Hazelaar (niet volledig)
-  Vlier
-  Hop
-  Riet (land)
-  Adelaarsvaren
-  Gele lis (niet volledig)
-  Waterviolier
-  Stort berk, wilg en riet




Legenda

-  Zwarte els
-  idem opslag
-  Wilg (smalbladig)
-  idem opslag/rij
-  Es
-  Klimop
-  Hazelaar (niet volledig)
-  Vlier
-  Hop
-  Riet (land)
-  Adelaarsvaren
-  Gele lis (niet volledig)
-  Waterviolier
-  Stort berk, wilg en riet

Indicatorsoorten


indicatie	soorten aspecten
permanent watervoerende sloten, voedselrijk, grote schommelingen en deels droogvallend	Gele lis
waterstroming relatief ondiep onder maaiveld (geen kwel) of stroming in sloten	Riet
lokale kwel (koolzuurrijk) van grondwater uit ruggen	Waterviolier
basenhoudende en vochtig-natte gronden ofwel bij kwel in veengronden (in het verleden) ofwel in infiltratiegronden waarbij basenhoudend grondwater relatief ondiep zit.	Els
	Vertiele klimop
	Adelaarsvaren
Indicatief voor gebufferde eiken-beukenbossen (droog)	Hazelaar
Indicatief voor gebufferde essen-iepenbossen (vochtig)	Hop
	Vlier (relatief vochtig)
	Es (relatief vochtig en basenrijk)
(voormalig) natte standplaatsen voedselrijk	(opslag) smalbladige wilg
voedselrijk stagnant in neerslagrijke periodes	Stort: berk wilg en riet

- **indicatie soorten aspecten**
- Opmerking: de meeste soorten geven een naar verhouding hogere pH aan. In het pleistocene deel van ons land wijst dat op invloed van basenhoudend grondwater. In het verleden moet deze invloed dominant zijn geweest (zie het verspreidingsbeeld in combinatie met indicatie) in tegenstelling tot nu. Ook leem kan bron zijn van de hogere pH, maar dan moet het ondiep zitten. Indien het dieper zit kan het ook bron zijn voor de basen in het grondwater.
- Het reliëf in Gijzenrooi genereert nog altijd grondwaterstroming. Dat valt af te leiden uit de verspreidingskaartjes van riet. Vooral de randen van ruggen zijn opmerkelijk, daar stroomt nog water onder het maaiveld of zit relatief ondiep, hoewel daarbij nog nauwelijks kwel optreedt naar het maaiveld (nauwelijks nog kwelindicatoren behalve in De Zeggen en Vloeiweide).
- Het verschil tussen vroeger en nu is dat voorheen in de zones rond de ruggen waarschijnlijk wel flink kwel optrad. Diepe droogvallende sloten in het gebied ondersteunen deze conclusie. Het was voorheen zo nat dat zeer diepe sloten nodig waren om de gewenste drooglegging te borgen. Die sloten zullen voorheen door het jaar heen watervoerend zijn geweest. Nu vallen ze droog in een belangrijk deel van het jaar valt af te leiden uit de veldverkenning. Waar zitten de bevoeiingsrelicten in de gradient van hoog naar laag is nu de vraag. Hoe hoger ze zitten op de gradient des te natter het gebied is geweest.




Legenda

	Zwarte els
	idem opslag
	Wilg (smalbladig)
	idem opslag/rij
	Es
	Klimop
	Hazelaar (niet volledig)
	Vlier
	Hop
	Riet (land)
	Adelaarsvaren
	Gele lis (niet volledig)
	Waterviolier
	Stort berk, wilg en riet



Legenda

	Zwarte els
	idem opslag
	Wilg (smalbladig)
	idem opslag/rij
	Es
	Klimop
	Hazelaar (niet volledig)
	Vlier
	Hop
	Riet (land)
	Adelaarsvaren
	Gele lis (niet volledig)
	Waterviolier
	Stort berk, wilg en riet



Adres of plaats zoeken...



Gijzenrooi


- Zwarte els
- idem opslag
- Wilg (smalbladig)
- idem opslag/rij
- Es
- Klimop
- Hazelaar (niet volledig)
- Vlier
- Hop
- Riet (land)
- Adelaarsvaren
- Gele lis (niet volledig)
- Waterviolier
- Stort berk, wilg en riet

100m

4.881 380.020 Meter

Esri Nederland, Community Maps Contributors | Esri Nederland, AHN

POWERED BY
esri



of plaats zoeken...



Gijzenrooi


- Zwarte els
- idem opslag
- Wilg (smalbladig)
- idem opslag/rij
- Es
- Klimop
- Hazelaar (niet volledig)
- Vlier
- Hop
- Riet (land)
- Adelaarsvaren
- Gele lis (niet volledig)
- Waterviolier
- Stort berk, wilg en riet

100m
4.915 380.304 Meter

Adres of plaats zoeken...



	Zwarte els
	idem opslag
	Wilg (smalbladig)
	idem opslag/rij
	Es
	Klimop
	Hazelaar (niet volledig)
	Vlier
	Hop
	Riet (land)
	Adelaarsvaren
	Gele lis (niet volledig)
	Waterviolier
	Stort berk, wilg en riet





- Zwarte els
- idem opslag
- Wilg (smalbladig)
- idem opslag/rij
- Es
- Klimop
- Hazelaar (niet volledig)
- Vlier
- Hop
- Riet (land)
- Adelaarsvaren
- Gele lis (niet volledig)
- Waterviolier
- Stort berk, wilg en riet

Adres of plaats zoeken...




- Zwarte els
- idem opslag
- Wilg (smalbladig)
- idem opslag/rij
- Es
- Klimop
- Hazelaar (niet volledig)
- Vlier
- Hop
- Riet (land)
- Adelaarsvaren
- Gele lis (niet volledig)
- Waterviolier
- Stort berk, wilg en riet

De zeggen
(wilg, els, berk)

100m

5.084 381.09



De zeggen
(wilg, els, berk)

- Zwarte els
- idem opslag
- Wilg (smaalbladig)
- idem opslag/rij
- Es
- Klimop
- Hazelaar (niet volledig)
- Vlier
- Hop
- Riet (land)
- Adelaarsvaren
- Gele lis (niet volledig)
- Waterviolier
- Stort berk, wilg en riet

100m

4.889 380.453 Meter

Adres of plaats zoeken...



De zeggen
(wilg, els, berk)


- Zwarte els
- idem opslag
- Wilg (smalbladig)
- idem opslag/rij
- Es
- Klimop
- Hazelaar (niet volledig)
- Vlier
- Hop
- Riet (land)
- Adelaarsvaren
- Gele lis (niet volledig)
- Waterviolier
- Stort berk, wilg en riet

100m

4.731 380.891 Meter

Esri Nederland, Community Maps Contributors | Esri Nederland, AHN

POWERED BY
esri



KWEL

●

idem opslag

●

Klimop


—

Adelaarsvaren

○

Waterviolier

lokale kwel (koolzuurrijk) van grondwater uit ruggen	Waterviolier
basenhoudende en vochtig-natte gronden ofwel bij kwel in veengronden (in het verleden) ofwel in infiltratiegronden waarbij basenhoudend grondwater relatief ondiep zit.	Els
	Vertiele klimop
	Adelaarsvaren



NAT




Riet (land)

Gele lis (niet volledig)

Stort berk, wilg en riet


permanent watervoerende sloten, voedselrijk, grote schommelingen en deels droogvallend	Gele lis
waterstroming relatief ondiep onder maaiveld (geen kwel) of stroming in sloten	Riet



BOSSEN

	Es
	Hazelaar (niet volledig)
	Vlier
	Hop

Indicatief voor gebufferde eiken-beukenbossen (droog)	Hazelaar
Indicatief voor gebufferde essen-iepenbossen (vochtig)	Hop
	Vlier (relatief vochtig)
	Es (reatief vochtig en basenrijk)



REST

- Wilg (smalbladig)
- ▬ idem opslag/rij
- ▬ S Stort berk, wilg en riet

(voormalig) natte standplaatsen voedselrijk	(opslag) smalbladige wilg
voedselrijk stagnant in neerslagrijke periodes	Stort: berk wilg en riet